

B I J D R A G E

TOT DE KENNIS DER

N O T A C A N T H I N I

VAN DEN

S O E N D A - M O L U K S C H E N A R C H I P E L ,

DOOR

D r . P . B L E E K E R .

B I D R A G E

TOT DE KENNIS DER

N O T A C A N T H I N I

VAN DEN

SOENDA - MOLUKSCHEN ARCHIPEL.



Deze kleine familie wordt in den Soenda-Molukschen Archipel, voor zoo verre mij tot heden bekend is, vertegenwoordigd door 4 soorten, te weten 1 van *Rhynchobdella* en 3 van *Mastacembelus*. Drie dezer soorten zijn reeds sedert lang in de wetenschap bekend en in het VIIIste deel der *Histoire naturelle des Poissons* van CUVIER VALENCIENNES beschreven. De 4e soort, eene species van *Mastacembelus* is geheel nieuw voor de wetenschap. Ik ontving haar van mijnen ambtgenoot den heer J. WOLFF van *Banjermassing* (Borneo), waar zij in de rivieren leeft. Zij is zeer kenbaar door haar zwart ligehaam dat met earmosijn-roode overlangsche banden is geteekend, een karakter, waarnaar ik haar *Mastacembelus erythrotaenia* genoemd heb. De drie sedert lang bekende soorten zijn:

1. *Rhynchobdella ocellata* CV., die reeds aan NIEUHOFF bekend was en niet alleen in de zoete wateren van Java, maar ook op Ceylon, te Pondichery, Tranquebar en in Bengalen voorkomt.

2. *Mastacembelus unicolor* K. v. H., door KUHLE en VAN HASSELT op Java ontdekt, waar hij in alle grootere rivieren sehijnt voor te komen.

3. *Mastacembelus maculatus* CV., door professor REINWARDT in de Molukken ontdekt.

Rhynchobdella ocellata en *Mastacembelus unicolor* zijn in talrijke speemina in mijne verzameling vertegenwoordigd. Van *Mastacembelus maculatus* is het mij echter tot nog toe niet gelukt een speeimen te erlangen.

Ten opzichte van *Rhynchobdella* moet ik aanteekenen, dat door CUVIER VALENCIENNES onder de kenmerken van dit geslacht ten onregte opgegeven is het niet met elkander vereenigd zijn der rug, staart en aarsvinnen. Bij mijn grootste exemplaar van *Rhynchobdella* zijn echter die vinnen zoodanig vergroeid, dat de staartvin niet van de rug- en aarsvinnen te onderkennen is. Dit exemplaar is 280 millimeters lang. Bij alle de jongere exemplaren zijn deze drie vinnen geïsoleerd. Soms blijft de staartvin bij *Rhynchobdella ocellata* in ontwikkeling terug. Bij een mijner specimina heeft zij nauwelijks het zesde van de lengte van den kop, terwijl zij bij de meeste overige exemplaren slechts $2\frac{1}{2}$ maal gaat in de lengte van den kop. Overigens gelijken alle mijne specimina zoo zeer op elkander, dat zij blijkbaar tot dezelfde soort behooren. Bij mijne kleinste individu's ziet men geelachtige dwarsche banden over het ligchaam. De oogachtige rugvinvlekken zijn hier ook het fraaiste. Het aantal vinstralen, hoezeer bij verschillende individu's verschillend, is niet afhankelijk van hunnen leeftijd.

RHYNCHOBDELLA Bl. Schn.

Rhynchobdella ocellata CV. Poiss. VIII. p. 328. (species unica).

Rhynchobd. corpore elongato compresso, altitudine $7\frac{1}{2}$ ad $8\frac{1}{2}$ in ejus longitudine; capite (rostro incluso) 5 circiter in longitudine corporis; rostro elongato infra concavo striato 2 circiter in longitudine capitis longe ante maxillam inferiorem producto; ore parvo; oculis parvis in medio capite sitis; squamis minimis lateribus 190 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali spinosa in 3a quinta, parte spinosa et pinna anali in ultima tertia parte corporis incipientibus; spina dorsali ultima vel penultima ceteris longiore; pinnis pectoralibus brevibus rotundatis 3 in longitudine capitis, dorsali caudali et anali junioribus distinctis sed approximatis, caudali rotundata vel truncata; colore supra rufescente-viridi infra flava vitta oculo-caudali flava; pinnis viridescens, verticalibus flavescens guttatis, anali flava limbata, dorsali radiosa basi ocellis 2 ad 5 nigris annulo luteo cinctis.

B. 6. D. 18/47 ad 18/54 vel 19/48 ad 19/53. P. 20 vel 21. A. 3/46 ad 3/50. C. 9 ad 15.

Synon. *Vijfoogh* Nieuh. Gedenk. Zee- en Lantr. fig.

Pentopthalmus Willughby. Append. tab. 10. 428.

Mastacembelus maxilla superiore longissima etc. Gronov. Zooph. p. 133.

Ophidium aculeatum Bloch. Ausl. Fisch. tab. 159. f. 2. Bonnaterre Encycl. méth. tab. 26. f. 90.

Elephantenrüssel Bloch. ibid.

Trompe Bloch. ibid.

Rhynchobdella orientalis Bl. Schn. Syst. posth. p. 478.

Rhynchobdella aral Bl. Schn. ib. p. 479. tab. 89.

Ophidium rostratum Shaw. Gen. Zool. IV. 1. p. 73.

Macrogathus aculeatus Lacép. Poiss. II. p. 284. Ham. Buch. Gang. Fish. p. 29.

Macrogathe aiguillonné Lacép. ib. p. 284.

Macrogathus ocellatus Ham. Buch. Gang. Fish. p. 29.

Rhynchobdella aral CV. Poiss. VIII. tab. 239.

Rhynchobdelle ocellée CV. ib. p. 328.

Aral de Coromandel CV. ib. p. 328.

Aral Incol. Ponticer.

Thelia Cingalens.

Ikan Sili et *Ikan Sisili* Mal. et Javan.

Habit. *Batavia*, *Purworedjo*, *Surabaya*, *Modjokerto*, *Surakarta*, in fluviis.
Longitudo 280 millimetr.

MASTACEMBELUS Gronov. CV.

I. Pinnae verticales contiguae sed distinctae.

A. Rostrum tentaculis 2 brevibus trilobum.

a. Corpus supra fuscens infra flavescens; pinnae verticales fuscens flava limbatae, pectorales flavae fasciis 2 transversis fuscis.

Mastacembelus unicolor K. v. H. CV. Poiss. VIII. p. 332.

Mastacemb. corpore elongato compresso altitudine $8\frac{1}{2}$ ad 11 in ejus longitudine; capite 5 ad $6\frac{1}{2}$ in longitudine corporis; rostro $2\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitis apice tentaculis 2 brevibus trilobo, parte producta rictu oris brevior; praeoperculo spinis vel dentibus 3 ad 5; linea laterali rectiuscula; squamis minimis non ciliatis; pinnis verticalibus contiguis basi unitis sed distinctis, dorsali parte spinosa supra mediam pinnam pectoralem incipiente parte radiosa longiore; pectoralibus et caudali obtusis rotundatis, anali spina 2a valida longa; appendice anali oblongo-ovali; colore corpore supra fuscens ventre flavescens, lateribus maculis magnis seriatis vel fasciis

longitudinalibus diffusis lutescentibus; pinnis pectoralibus flavis fuscis 2 transversis fuscis, verticalibus fuscis-
tibus flavo limbatis.

B. 6. D. 33 — 80 ad 84 vel 34 — 80 ad 84. P. 28. A. 3 — 75 ad 3 — 81. C. 18.

Synon. *Mastacembla unicolore* CV. Poiss. VIII. p. 353

Mastacembelus marginatus Blkr. Topogr. Batav.

Ikan Brot et Ikan Brot-brot Mal. Batav., Sund. et Javan.

Habit. *Batavia, Serang, Surakarta, Modjokerto, Surabaya* in fluviis et paludibus.

II. Pinnac verticales unitae non distinctae.

A. Rostrum tentaculis 2 brevibus trilobum.

a. Corpus nigrum fasciis cephalo-caudalibus 4 carmosinis; pinnac verticales
nigrae rubro limbatae, pectorales rubrae annulo nigro.

Mastacembelus erythrotaenia Blkr.

Mastacemb. corpore elongato compresso, altitudinē 9 circiter in ejus longitudine; capite $5\frac{1}{2}$ ad 6 in longitudi-
ne corporis; rostro $2\frac{1}{2}$ in longitudine capitis apice tentaculis 2 brevibus trilobo, parte producta rictu oris bre-
viorē; praeoperculo spinis vel dentibus 4; linea laterali rectiuscula; squamis minimis non ciliatis; pinuis verti-
calibus unitis non distinctis, dorsali parte spinosa parte radiosa longiore supra apicem pinnae pectoralis incipiente,
anali spina 2a magna valida, pectoralibus rotundatis; colore toto corpore nigro vittis cephalo-caudalibus 4 carmo-
sinis, vitta secunda ad angulum oris incipiente; pinnis verticalibus nigris carmosino limbatis, pectoralibus ru-
bris annulo irregulari nigro.

B. 6. D. 35 — 75. P. 22 vel 23. A. 3 — 71. C. 12 vel 14.

Habit. *Banjermassing*, Borneo austro-orientalis, in fluviis (J. Wolff).

Longitudo speciminis unici 301 millimetr.

Adnot. *Mastacembeli maculati* CV. diagnosis Cuvieriana sequens:

Mastacemb. rostro carnosio longiore quam in *Mastacemb. marmorato*, ponticeriano, armato, paucalo, haleppensi
et unicolore; rictu oris longitudine 6 in longitudine capitis; pinnis verticalibus unitis vix distinctis, caudali
truncata; appendice anali; colore corpore profunde fusco dorso maculis 14 vel 15 nigris, cauda ad basin pinnae
analis maculis nigris 17 vel 18, mento et ventre albis vittis transversis fuscis irregularibus; pinnis verticalibus
fuscis, dorsali et caudali albo punctatis, anali albo marginata.

D. 30 — 63 vel 30 — 61. A. 3 — 66 vel 3/67.

Synon. *Rhynchobdella maculata* Rwdt.

Mastacembla tachté CV. Poiss. VIII. p. 340.

Mastacembla maculé Cuv. Règn. anim. éd. lux. Poiss. tab. 55. fig. 1.

Habit. *Insul. Molucc.*

Longitudo 210 millimetr.

Scipsi BATAVIA Calendis Martii MDCCCL.

